








Recomandări pentru vița de vie

Recomandări pentru vița de vie

► Vița de vie

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---------------------|---|
| Lăstari 10-15 cm (BBCH 11-13) |  | Envidor 240 SC | Acarieni | 0,4 l/ha | Tratamentul se poate efectua începând cu faza de lăstari 10-15 cm și până la sfârșitul înfloritului, la depășirea pragului economic de dăunare (15 acarieni/lăstar sau 3-5 acarieni/frunză). |
| Degajare ciorchini (BBCH 15) |  | Antracol 70 WP | Mană | 2 kg/ha | În anii cu infecție timpurie de mană se recomandă tratamentul de mană cu Profiler 71 WG sau Mikal Flash. Tratamentul cu Decis Mega se face la avertizare, fiind esențial pentru controlul larvelor de molii. Alternativă: Decis 25 WG. |
| | | Falcon 460 EC | Făinare | 0,3 l/ha | |
| | | Decis Mega 50 EW Basta 14 SL (buruieni mono- și dicotile anuale și perene) | Moliile strugurilor | 0,15 l/ha 4 l/ha | |
| Începutul înfloririi (BBCH 55-57) |  | Profiler 71 WG | Mană | 2,25-2,5 kg/ha | Alternativa pentru mană: Mikal Flash 3 kg/ha pentru tratamente curative antisporulante. Alternativa pentru făinare: Falcon 0,3 l/ha sau Folicur Solo 0,4 l/ha Tratament la avertizare. Alternativă: Decis 25 WG la 30 g/ha. |
| | | + Flint Max | Făinare+Putregai negru | 0,16 kg/ha | |
| | | + Decis Mega 50 EW | Moliile strugurilor | 0,15 l/ha | |
| Sfârșitul înfloririi (BBCH 65-69) |  | Verita | Mană | 2-2,5 kg/ha | Alternativă pentru mană + făinare + putregai cenușiu: Mikal Flash 3 kg/ha + Falcon 460 EC 0,3 l/ha + Mythos 3 l/ha Tratament important pentru prevenirea primelor infecții cu putregai. Alternativă: Mythos 3 l/ha. |
| | | + Folicur Solo 250 EW | Făinare | 0,4 l/ha | |
| | | + Teldor 500 SC | Putregai cenușiu | 1 l/ha | |
| Creșterea boabelor (BBCH 71-75) |  | Mikal Flash | Mană | 3 kg/ha | Alternativă pentru mană + făinare: Melody Compact 1,5 kg/ha + Folicur Solo 250 EW 0,4 l/ha Erbicid total. Se aplică doar pe buruieni. |
| | | Falcon 460 EC | Făinare | 0,3 l/ha | |
| | | Basta 14 SL (buruieni mono- și dicotile anuale și perene) | | 4 l/ha | |
| Compactarea ciorchinului (BBCH 77-79) |  | Melody Compact 49 WG | Mană | 1,5 kg/ha | Alternativă pentru făinare: în parcelele cu atac se utilizează un produs specific (Falcon, Flint Max). Tratamentul preventiv împotriva putregaiului cenușiu este obligatoriu. |
| | | + Folicur Solo 250 EW | Făinare | 0,4 l/ha | |
| | | + Teldor 500 SC | Putregai cenușiu | 1 l/ha | |
| Intrarea în pârgă (BBCH81-89) |  | Mythos | Putregai cenușiu | 3 l/ha | Tratament preventiv obligatoriu, foarte important pentru evitarea instalării putregaiului cenușiu în focarele de atac. Tratament foarte important în caz de presiune de atac a bolii, aplicat la 2-3 săptămâni înainte de recoltare. |
| | | + Decis Mega 50 EW | Moliile strugurilor | 0,15 l/ha | |
| | | Teldor 500 SC | Putregai cenușiu | 1 l/ha | |

Datele de mai sus au caracter general

În funcție de condițiile specifice fiecărui an și zone, produsele pot fi utilizate și între momentele de tratament menționate mai sus.