

Intervalul de aplicare recomandat

► Porumb

Combaterea dăunătorilor

Calypto 480 SC: 90 ml/ha

Combaterea rățișoarei porumbului
în vegetație ca tratament de corecție

Calypto 480 SC: 150 ml/ha
Viermele vestic al rădăcinilor (adultți)

Combaterea buruienilor

Buctril Universal: 0,8 l/ha buruieni dicotile anuale și perene

Equip: 1,5 l/ha pentru buruieni mono- și dicotile anuale și
2-2,5 l/ha pentru costrei și pir.

Laudis OD 66: 2-2,25 l/ha; buruieni dicotile și monocotile
anuale.


Capreno 547 SC: 0,22-0,29 l/ha; buruieni dicotile și
monocotile anuale

Adengo 465 SC: 0,3-0,35 l/ha postemergent timpuriu
Merlin Duo: 1,8-2 l/ha postemergent timpuriu
Merlin Flexx: 0,42 l/ha postemergent

Combaterea bolilor

Prosaro 250 EC: 1 l/ha
Combaterea fuzariozei

Adengo 465 SC: 0,35-0,4 l/ha preemergent
Merlin Duo: 2,25-2,5 l/ha preemergent
Merlin Flexx: 0,3-0,42 l/ha preemergent



Intervalul recomandat de utilizare a produsului

Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizării produselor, citiți cu atenție recomandările cuprinse în acest catalog și în eticheta produsului.