








Recomandări pentru vița de vie

Recomandări pentru vița de vie

► Vița de vie

Lăstari 10-15 cm (BBCH 11-13)		Envidor 240 SC	Acarieni	0,4 l/ha	Tratamentul se poate efectua începând cu faza de lăstari 10-15 cm și până la sfârșitul înfloriturii, la depășirea pragului economic de dăunare (15 acarieni/lăstar sau 3-5 acarieni/frunză).
Degajare ciorchini (BBCH 15)		Antracol 70 WP	Mană	2 kg/ha	În anii cu infecție timpurie de mană se recomandă tratamentul de mană cu Profiler 71 WG sau Mikal Flash. Tratamentul cu Decis 25 WG se face la avertizare, fiind esențial pentru controlul larvelor de molii. Erbicid total. Se aplică doar pe buruieni.
		Falcon 460 EC	Făinare	0,3 l/ha	
		Decis 25 WG Basta 14 SL (buruieni mono- și dicotile anuale și perene)	Moliile strugurilor	0,30 g/ha 4 l/ha	
Începutul înfloririi (BBCH 55-57)		Profiler 71 WG	Mană	2,25-2,5 kg/ha	Alternativa pentru mană: Mikal Flash 3 kg/ha pentru tratamente curative antisporulante. Alternativa pentru făinare: Falcon 0,3 l/ha sau Folicur Solo 0,4 l/ha Tratament la avertizare
		NOU Luna Experience 400 SC	Făinare	0,375 l/ha	
		Decis 25 WG	Moliile strugurilor	0,30 g/ha	
Sfârșitul înfloririi (BBCH 65-69)		Verita	Mană	2-2,5 kg/ha	Alternativă pentru mană: Mikal Flash 3 kg/ha Alternativă pentru făinare: Falcon 460 EC 0,3 l/ha Tratament important pentru prevenirea primelor infecții cu putregai. * Vezi comentariul din josul paginii.
		Flint Max	Făinare+Putregai negru	0,16 kg/ha	
		Teldor 500 SC *	Putregai cenușiu	1 l/ha	
Creșterea boabelor (BBCH 71-75)		Mikal Flash	Mană	3 kg/ha	Alternativă pentru mană: Melody Compact 1,5 kg/ha Alternativă pentru făinare: Folicur Solo 250 EW 0,4 l/ha Se pot aplica 2 tratamente în intervalul BBCH 69-91 Erbicid total. Se aplică doar pe buruieni.
		NOU Luna Experience 400 SC	Făinare	0,375 l/ha	
		Movento 100 SC	Păduchi țestoși	0,75 l/ha	
		Basta 14 SL (buruieni mono- și dicotile anuale și perene)		4 l/ha	
Compactarea ciorchinului (BBCH 77-79)		Melody Compact 49 WG	Mană	1,5 kg/ha	Alternativă pentru făinare: în parcelele cu atac se utilizează un produs specific (Falcon 460 EC, Flint Max). Tratamentul preventiv împotriva putregaiului cenușiu este obligatoriu. * Vezi comentariul din josul paginii.
		Folicur Solo 250 EW	Făinare	0,4 l/ha	
		Teldor 500 SC *	Putregai cenușiu	1 l/ha	
Intrarea în pârgă (BBCH81-89)		Teldor 500 SC *	Putregai cenușiu	1 l/ha	Tratament preventiv obligatoriu, foarte important pentru evitarea instalării putregaiului cenușiu în focarele de atac. * Vezi comentariul din josul paginii.
		Decis 25 WG	Moliile strugurilor	0,30 g/ha	
		Teldor 500 SC *	Putregai cenușiu	1 l/ha	

Datele de mai sus au caracter general. În funcție de condițiile specifice fiecărui an și zone, produsele pot fi utilizate și între momentele de tratament menționate mai sus.

* Teldor se utilizează în maximum 2 tratamente pe sezon. În cazul depășirii numărului maxim de tratamente, se va utiliza alt produs omologat pentru combaterea putregaiului cenușiu.